

DİĐERLERİ (LOKAL KULLANILANLAR)

LOKAL KULLANILAN
DİĐER ANTİFUNGALLER

-TOLNAFTAT
-AMOROLFİN
-SİKLOPİROKS OLAMİN
-YAĐ ASİTLERİ (KAPRİLİK VE
UNDESİLENİK ASİT), İYOD
BENZOİK ASİT, SALİSİLİK ASİT,
KÜKÜRT , SODYUM, TİYOSÜLFAT,
8-HİDROKSİKİNOLON TÜREVLERİ

Tolnaftat

- Dermatofitlere karşı etkilidir (Microsporum, Trichophyton türleri).

Etki Mekanizması: Skualen epoksidazı inhibe ederek mantar hücre duvarında ergosterol biyosentezini engelleyerek fungusid etki oluşturur.

- Tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor tedavisinde endikedir. Özellikle ayak parmaklarındaki dermatofitozlara ve pitiriazis versicolora karşı kullanılır.
- Nadiren deride tahriş kaşıntıya neden olur.

TÜRKİYE'DE BULUNAN TOLNAFTAT MÜSTAHZARLARI

- MİKODERM ÇÖZ. %1
- MİKODERM MERHEM %1

Amorolfın

- Tırnak mantarı –onikomikozis- tedavisinde kullanılır.

Etki Mekanizması: Ergosterol sentezini engelleyerek etki gösterir.

- Türkiye’de ilaçlı tırnak cilası (oje) formunda pazarlanmıřtır.

TÜRKİYE’DE AMOROLFİN İÇEREN MÜSTAHZARLAR

- LOCERYL İLAÇLI TIRNAK CİLASI %5

Siklopiroks Olamin

- Dermatofitozlarda ve cilt ve vajina kandidiyazisinde lokal olarak kullanılır.

Etki Mekanizması: Mantar hücresi içinde birikir, belli yapılara ve organellere geridönüşümsüz bağlanarak etki gösterir.

TÜRKİYE'DE SIKLOPİROKS OLAMİN İÇEREN MÜSTAHZARLAR

- CANOLEN KREM
- NİBULEN KREM %1
- NİBULEN DERMAL ÇÖZ. %1
- CANOLEN DERİYE UYG. SPREY ÇÖZ %1
- CANOLEN VAJİNAL KREM %1
- LOPROX ŞAMPUAN %1.5
- SEBİROX ŞAMPUAN

KAYNAKLAR

- Kayaalp O. *Tıbbi Farmakoloji 2. Cilt*, 13. Baskı, Ankara, Pelikan Yayıncılık, 2012.
- Li Moorman R. In Opioids: Whalen K(ed). *Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology*, 6. ed. Çin, Wolters Kluwer, 2015.
- <https://www.tebrp.com>